Alieni in Umbria

Conoscere per creare consapevolezza

Centro Arpa Umbria

“Cambiamento Climatico e Biodiversità in ambienti Lacustri e aree Umide”

Isola Polvese

28 settembre 2019

Malerbe nelle colture agrarie e negli agroecosistemi

Euro Pannacci

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali
Università degli Studi di Perugia

Definizione di 'malerba'

Non esiste una definizione universalmente accettata:

- Concetto antropocentrico e non ecologico
- Pianta che cresce dove non è desiderata (Blatchley, 1912)

Definizione malerbologica:

- Si definisce malerba ogni pianta o vegetazione, esclusi i funghi, che interferisce con gli obiettivi dell'uomo (EWRS)
- Il termine malerba è associato al concetto di danno
- Necessità di distinguere tra dannosità ed indesiderabilità
 - ✓ Criterio di ordine ecologico ed economico (vantaggi e svantaggi)
 - ✓ Concetto di soglia di densità

Caratteristiche

- **Il concetto di malerba è relativo**
 - Una specie può considerarsi o meno una malerba a seconda delle circostanze in cui si sviluppa
 - Es. rinascite indesiderate di specie coltivate in altre colture (*volunteer crops*)
 - Es. *Cynodon dactylon* è considerata una delle più importanti malerbe al mondo, ma è anche una ottima specie da tappeto erboso
 - Es. *Lolium multiflorum* è una delle più temute malerbe dei frumenti, ma è anche un'ottima specie foraggera
- **Si tratta, in genere, di specie spontanee che si adattano agli habitat antropizzati (agroecosistemi, aree extragricole)**
- **Sfruttano le “nicchie rigenerative” lasciate dai disturbi operati dall'uomo con le pratiche agronomiche**
- **Sono un grande esempio di successo adattativo, simbolo di evoluzione**

Metodi di moltiplicazione

- Semi
- Propagazione vegetativa

Cicli biologici

- **ANNUALI:** riproduzione sessuata (terofite)
 - un ciclo biologico nel corso di un anno o meno
 - emergenza: primaverile, estiva, autunnale, invernale, indifferente
 - le più diffuse negli agroecosistemi
- **BIENNALI:** riproduzione sessuata
 - un ciclo biologico ogni due anni
 - emergenza primaverile e/o autunnale
 - fase vegetativa → vernalizzazione → fase riproduttiva
 - presenti in agroecosistemi poco disturbati (prati, arboreti, pascoli)
- **PERENNI:** riproduzione sessuata e propagazione vegetativa
 - Pluriennali (emicriptofite): propagazione statica; specie cespitose con gemme poste a livello del terreno
 - Perennanti (geofite): propagazione dinamica; specie vivaci con organi di propagazione vegetativa interrati

Principali malerbe annuali microterme

- *Alopecurus myosuroides*
- *Lolium* spp.
- *Poa* spp.
- *Phalaris* spp.
- *Avena* spp.
- *Bromus* spp.

- *Sinapis arvensis*
- *Galium aparine*
- *Stellaria media*
- *Papaver rhoeas*
- *Fumaria officinalis*
- *Matricaria chamomilla*
- *Anagallis arvensis*
- *Stachys annua*
- *Lamium* spp.
- *Veronica* spp.

Principali malerbe annuali macroterme

- *Echinochloa crus-galli*
- *Setaria* spp.
- *Digitaria sanguinalis*
- *Amaranthus* spp.
- *Chenopodium* spp.
- *Polygonum* spp.
- *Portulaca oleracea*
- *Datura stramonium*
- *Solanum nigrum*
- *Abutilon theophrasti*
- *Xanthium strumarium*

Principali malerbe perenni

- *Sorghum halepense*
- *Cynodon dactylon*
- *Cyperus spp.*
- *Equisetum arvense*
- *Convolvulus arvensis*
- *Cirsium arvense*
- *Rumex spp.*

Principali malerbe parassite

- *Cuscuta* spp.
- *Phelipanche ramosa*

Malerbe esotiche

Le specie vegetali esotiche rappresentano circa il:

- ✓ 12% della flora complessiva in Europa
- ✓ 13,4% in Italia (circa 1023 *taxa*)
- ✓ 8% (circa 200 specie) della flora umbra
- ✓ Si dividono in archeofite (prima del 1492~1500) e neofite (dopo il 1492~1500)

Molte delle malerbe degli agroecosistemi sono specie esotiche

Malerbe esotiche

La pericolosità delle malerbe negli agroecosistemi non è data dal fatto che siano o meno esotiche, ma per lo più dal fatto che:

Presentano caratteristiche biologiche ed ecologiche utili per adattarsi agli agroecosistemi e alle pratiche agricole che vi si attuano:

- ✓ Semi (quantità, longevità, dormienza) e disseminazione (anemocora, zoocora...)
- ✓ Propagazione vegetativa (rizomi, stoloni, bulbi, tuberi, gemme avventizie)
- ✓ Elevata capacità competitiva (luce, acqua, nutrienti e interazioni allelopatiche)
- ✓ Adattamento alle pratiche agricole e ai cambiamenti climatici

Necessità di → Conoscere per poter Gestire

Ruolo della Malerbologia

Disciplina che integra le conoscenze agronomiche con quelle relative ai mezzi di controllo ed alla biologia, ecologia e dinamica di popolazione delle malerbe

Quantità di semi prodotti dalle malerbe

Numero di semi per
pianta

500-5000

Malerbe

Avena spp.
Echinochloa crus-galli
Fallopia convolvulus
Galium aparine
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Stellaria media

5000-50000

Papaver rhoeas
Matricaria chamomilla
Capsella bursa-pastoris

> 50000

Amaranthus retroflexus
Artemisia vulgaris
Cirsium arvense
Portulaca oleracea
Chenopodium album

Disseminazione delle malerbe

Valutazione della disseminazione delle malerbe nel frumento

Malerbe	n. piante m ⁻²
<i>Lolium multiflorum</i>	33.5 (9.2)
<i>Matricaria chamomilla</i>	8.5 (1.4)
<i>Papaver rhoeas</i>	9.5 (2.0)
<i>Viola tricolor</i>	5.5 (3.8)
TOTALE	57 (9)

Seed traps

TOTALE SEMI
(n. m⁻²)
62484

Disseminazione delle malerbe

Valutazione della disseminazione delle malerbe nel mais

Effects of mechanical and chemical methods on weed control, weed seed rain and crop yield in maize, sunflower and soyabean

Euro Pannacci*, Francesco Tei

Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, University of Perugia, Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia, Italy

- Nessun controllo → 57033 semi m⁻²
- + 10% di efficacia → - 5549 semi m⁻²
- Controllo ottimale → 0 semi m⁻²

Disseminazione delle malerbe

Anemocora

Zoocora

Longevità dei semi delle malerbe

Table 1. Longevity of different weed species in the seed bank (Source: Conn *et al.*, 2006)

Weed species	Maximum longevity (years)
<i>Calamagrostiscanadensis</i> (Michx.) Beauv.	8-14
<i>Hordeumjubatum</i> L.	7-8
<i>Elytrigiarepens</i> (L.) Nevski	4-6
<i>Avenafatua</i> L.	4-6
<i>Dracocephalumparviflorum</i> Nutt.	> 20*
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	> 20
<i>Galeopsistetrahit</i> L.	2-3
<i>Chenopodium album</i> L.	> 20
<i>Spergulaarvensis</i> L.	18-20
<i>Descurainiasophia</i> (L.) Webb ex Prantl.	16
<i>Polygonumpensylvanicum</i> L.	14-18
<i>P. aviculare</i> L.	10-14
<i>P. convolvulus</i> L.	6-8
<i>Matricariamatricarioides</i> (Less.) C.L. Porter	> 20
<i>Potentillanorvegica</i> L.	12-14
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medicus	> 20

N.B.: * about 60% of the seed were still viable after 20 years.

Conn *et al.*, 2006. *Weed Sci.* 54: 464-470.

da pochi anni a diverse decine di anni

Banca semi delle malerbe

Insieme dei semi non germinati presenti nel terreno e capaci, potenzialmente, di dare origine a nuove piante, annuali o perenni.

Restano esclusi i semi non vitali e quelli interrati troppo in profondità, che hanno scarse possibilità di essere riportati in superficie e germinare

Dinamica della banca semi

- È definita dal bilancio tra apporti e perdite di semi nel terreno;
- Conoscerla consente di individuare i momenti in cui concentrare gli interventi di controllo e capire l'importanza di determinati interventi gestionali;

Potenzialità rigenerativa delle gemme

- Il potenziale di rigenerazione dipende dal numero di gemme per unità di superficie/lunghezza e dalla dimensione degli organi stessi
- *Sorghum halepense*:
 - 600 km di rizomi in 1 ettaro e fino a 5'000 gemme prodotte da 1 pianta in un anno
- *Cyperus rotundus*:
 - da 1 tubero, prodotti 100 tuberi in 3 mesi e fino a 30'000 tuberi in 1 ettaro
- Capacità di persistenza:
 - radici a gemme > tuberi > rizomi > stoloni > bulbi

*Sorghum
halepense*
- rizomi -

Cyperus rotundus
- rizomi e tuberi -

Cynodon dactylon

*Equisetum
arvense*

Danni che arrecano le malerbe

- ✓ Perdite di produzione delle colture dovute alla competizione
- ✓ Peggioramento della qualità dei prodotti agricoli
- ✓ Peggioramento della qualità dei foraggi
- ✓ Incremento dei costi di produzione (es. interferiscono con la raccolta meccanica e manuale delle colture)
- ✓ Decremento del valore dei terreni (es. terreni con elevata presenza di semi e/o organi di propagazione vegetativa)
- ✓ Ospiti per insetti, patogeni, virus dannosi per le colture
- ✓ Problemi nelle aree extragricole (es. strade, ferrovie, aree pubbliche)
- ✓ Problemi per la salute umana (es. allergie, tossicità)

Perdite di produzione

Le malattie sono considerate tra le principali cause di perdita di produzione delle colture più diffuse al mondo

Coltura	Perdite (%) in assenza di controllo	Perdite (%) in presenza di controllo
frumento	23	8
riso	37	10
mais	40	11
patata	30	8
soia	37	8

(Oerke, 2006)

Perdite di produzione

Perdite di produzione medie per alcune colture
in assenza di controllo delle malerbe
(da dati sperimentali in Italia)

Coltura	Perdite (%)
Barbabietola z.	50-60
frumento	20-30
mais	30-40
soia	30-35
girasole	15-20

(Sattin & Tei, 2001)

Perdite di produzione

Effetti del controllo delle piante infestanti sulla produzione del frumento tenero (Italia centrale)

Trattamento	Ricoprimento infestanti (%)	Granella (t ha ⁻¹)	Incremento di resa (%)
Nessun controllo	231	2.2	-
Controllo insufficiente	102	3.8	+73
Controllo ottimale	0	4.7	+114

(Pannacci, 2008)

Malerbe
nel mais

Assenza di controllo delle malerbe

Controllo ottimale delle malerbe

Perdita di resa nel mais

LUNGHEZZA DELLA SPIGA (cm)

20
15
10
5

11

35

69

135

% DI RICOPRIMENTO DELLE MALERBE

Competizione delle
malerbe nelle
colture orticole

Peggioramento qualitativo in cipolla e cavolo cappuccio

Intelligent versus non-intelligent mechanical intra-row weed control in transplanted onion and cabbage

Bo Melander ^{a,*}, Boris Lattanzi ^b, Euro Pannacci ^b

^a Aarhus University, Faculty of Science and Technology, Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg, DK-4200 Slagelse, Denmark

^b University of Perugia, Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia, Italy

Peggioramento qualitativo dei prodotti agricoli

- riduzione della qualità intrinseca degli alimenti
- contaminazione dei prodotti alimentari

Contaminazione, con semi o parti di malerbe, del pisello da industria per la surgelazione e/o l'inscatolamento

Contaminazione, con semi o parti di malerbe, dello spinacio da industria per la surgelazione

Le malerbe interferiscono con le operazioni di raccolta

Incremento dei costi di produzione dovuto alle malerbe

Lavoro richiesto per la scerbatura manuale

Carota	100 - 500 h ha ⁻¹
Cipolla	100 - 300
Spinacio	100 - 200

Problematiche dovute alle malerbe nelle aree extragricole

Impatto su manufatti e arredo urbano

Problematiche dovute alle malerbe nelle aree extragricole

Impatto sulla rete ferroviaria

Problematiche dovute alle malerbe nelle aree extragricole

Impatto sulla viabilità stradale

Problematiche dovute alle malerbe nelle aree extragricole

Impatto sulla salute umana: produzione di allergeni

Poaceae

Artemisia vulgaris

Parietaria officinalis

Ambrosia artemisiifolia

Adattamento alle pratiche agronomiche e ai cambiamenti climatici

Conyza canadensis (L.) Cronq.

agronomy MDPI

Article
Effects of Light, Temperature, and Soil Depth on the Germination and Emergence of *Conyza canadensis* (L.) Cronq.

Daniele Ottavini ¹, Euro Pannacci ^{1,*}, Andrea Onofri ¹, Francesco Tei ¹ and Peter Kryger Jensen ²

$T_b = 6.8^\circ\text{C}$ → $T_c = 35.8^\circ\text{C}$

Popolazione Umbra (43° N)

Seed germination response to temperature for a range of international populations of *Conyza canadensis*

E TOZZI*, H BECKIE†, R WEISS‡, J L GONZALEZ-ANDUJAR‡, J STORKEY§, S Z H CICI* & R C VAN ACKER*

*Department of Plant Agriculture, University of Guelph, Guelph, ON, Canada, †Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), Saskatoon, SK, Canada, ‡Instituto de Agricultura Sostenible (C.S.I.C.), Córdoba, Spain, and §Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire, UK

T_b
 (8-9.5°C) Ontario
 (13-14°C) California
 (12.5-14°C) Spain
 (9.5-11°C) Iran
 (11-12.5°C) UK

Profondità di emergenza

0 mm →

2.5 mm →

5 mm →

10 mm →

- ✓ Ampio range di T per germinare → adattabilità ai cambiamenti climatici
- ✓ Elevata produzione e dispersione dei semi → invasività
- ✓ Emergenza da semi in superficie → diffusione nel minimum-tillage e no-tillage
- ✓ Scarsa sensibilità agli erbicidi → difficoltà nel controllo chimico
- ✓ **SOLUZIONE → interrimento dei semi → LAVORAZIONI DEL TERRENO**

Adattamento alle pratiche agronomiche

Bromus sterilis L.

Full Access

Secondary dispersal, spatial dynamics and effects of herbicides on reproductive capacity of a recently introduced population of *Bromus sterilis* in an arable field

H H Steinmann, L Klingebiel

First published: 10 September 2004 | <https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.2004.00413.x> | Cited by: 10

Results

Application of the mouldboard plough (inversion tillage treatment) led to complete absence of *B. sterilis* in both years. Establishment of *B. sterilis* only occurred within the subfield subjected to non-inversion tillage. *B. sterilis*

- ✓ Specie dei bordi campi e aree ruderali → nel passato nessun problema nei campi coltivati
- ✓ Bassa longevità dei semi (< 1 anno) → scarsa persistenza nel terreno (banca semi transitoria)
- ✓ Emergenza da semi in superficie → diffusione nel minimum-tillage e no-tillage
- ✓ Scarsa sensibilità agli erbicidi → difficoltà nel controllo chimico
- ✓ **Ciclo autunno-primaverile** → **oggi in espansione nei cereali autunno-vernini (frumenti, orzo..)**
- ✓ **SOLUZIONE** → **interramento dei semi** → **LAVORAZIONI DEL TERRENO** → **> COSTI**

Malerbe come flora “amica”

- utilità botanica e fitopatologica
 - ✓ Indicatori ambientali
 - ✓ Incremento della biodiversità
- utilità agronomica
 - ✓ protezione dei suoli dall’erosione
 - ✓ bilancio della sostanza organica
 - ✓ fitorimediazione
 - ✓ fonte di variabilità genetica
- uso medicinale
- fonte alimentare
 - ✓ es. *Amaranthus*, *Taraxacum*, *Cardus*...
 - ✓ foraggio (es. *Alopecurus*, *Phleum*...)

Malerbe e servizi agroecosistemici

- ✓ Gli impatti negative delle malerbe sulle piante coltivate sono ampiamente studiati, mentre meno si conosce sui benefici che la presenza delle malerbe può portare negli agroecosistemi
- ✓ In tal senso, gli obiettivi della ricerca in futuro dovranno essere:
 - ✓ Identificare i servizi agroecosistemici forniti (direttamente e indirettamente) dalle malerbe
 - ✓ Identificare le malerbe (specie, diversità e abbondanza) in grado di fornire tali servizi
 - ✓ Identificare eventuali altre specie (es. insetti utili, micorizze, ecc...) che interagiscono con le malerbe nel fornire i servizi agroecosistemici
 - ✓ Identificare le lacune nella letteratura disponibile per potenziali ulteriori ricerche

Malerbe e servizi agroecosistemici

Table 5.1 Agroecosystem services and dis-services that can be associated with weeds, with examples taken from the literature.

Service	Approach (examples)	Dis-service	Approach (examples)
Support wildlife	A for B (Marshall <i>et al.</i> , 2003; Storkey, 2006)	Hamper wildlife	A for B (Getz & Baker, 2008)
Aesthetics	A for B (Lindemann-Matthies <i>et al.</i> , 2010)	Unaesthetic (unpleasant landscape)	A for B (Sheppard <i>et al.</i> , 2006)
Support pollinators	A for B (Hyvönen & Huusela-Veistola, 2008)	Hamper pollinators	B for A (Derr, 2001)
Support beneficial arthropods	B for A (Norris & Kogan, 2000; Bàrberi <i>et al.</i> , 2010)	Support pests	B for A (Norris & Kogan, 2000; Bàrberi <i>et al.</i> , 2010)
Divert pests/pathogens from crop	B for A (Norris & Kogan, 2000)	Attract pests/pathogens	B for A (Norris & Kogan, 2000)
Allelopathy (vs other weeds)	B for A (Achhireddy & Singh, 1984)	Allelopathy (vs crops)	B for A (Foy & Inderjit, 2001)
Preserve soil quality	B for A (Gómez <i>et al.</i> , 2009)	Deplete soil quality	B for A (Smith <i>et al.</i> , 2011)
Provide alternative food/feed	B for A (Turner <i>et al.</i> , 2011)	Cause poisoning/gut disorders in livestock	B for A (DiTomaso, 2000)
Provide non-food functions	B for A (Chacón & Gliessman, 1982)	Cause allergies	A for B (Hao <i>et al.</i> , 2013)
Preserve yield/yield quality	B for A (Callaway <i>et al.</i> , 2005)	Reduce yield/yield quality	B for A (Boström <i>et al.</i> , 2003; Akbar <i>et al.</i> , 2011)
Phytoremediation	B for A (Wu <i>et al.</i> , 2005)	–	–

A for B = agriculture supporting biodiversity (species/habitat conservation services); B for A = biodiversity supporting agriculture (direct/indirect production-related services).

Gestione integrata delle malerbe

(Integrated Weed Management – IWM)

Principi

- Evitare l'eradicazione delle malerbe
 - ✓ una nicchia ecologica è prontamente riempita da altre specie
- Evitare la produzione e la dispersione di semi e propaguli
- Incrementare la capacità competitiva delle colture
- Promuovere la competizione tra le malerbe stesse
- Disturbare le “nicchie rigenerative” delle malerbe
- Conoscere ed interagire con la dinamica delle malerbe

Sistema di gestione integrata delle malerbe

1. Metodi indiretti o preventivi di gestione delle malerbe

- Sistemi agricoli e colturali
- Scelte agronomiche: rotazioni, lavorazioni, sistemazioni, ecc...

2. Metodi decisionali

- Informazioni su: se, quando, dove, come intervenire?

3. Metodi diretti di controllo delle malerbe

- Meccanici (sarchiatrici, sarchia-separatrici, finger-weeder, ecc.)
- Fisici (pirodiserbo, pacciamatura, solarizzazione)
- Biologici (insetti, funghi, bioerbicidi, ecc.)
- Chimici

Il successo del controllo integrato delle malerbe dipende dalla più efficace combinazione di **Metodi indiretti o preventivi**, **Metodi decisionali** e **Metodi di controllo**

2. Metodi decisionali

Decisioni Strategiche: > 1 anno (rotazioni, lavorazioni, sistemazioni, ecc...)

Decisioni Tattiche: nel corso di un ciclo colturale (colture, varietà, irrigazione, concimazione, ecc...)

⇒ 2 principi:

Soglie di densità delle malerbe
Periodo critico di competizione

Decisioni Operative: con quale metodo devo controllare le malerbe?

Gestione integrata delle malerbe

1. Metodi indiretti o preventivi di gestione delle malerbe

- Sistemi agricoli e colturali
- Scelte agronomiche: rotazioni, lavorazioni, sistemazioni, ecc...

2. Metodi decisionali

- Informazioni su: se, quando, dove, come intervenire?

3. Metodi diretti di controllo delle malerbe

- Meccanici (sarchiatrici, sarchia-separatrici, finger-weeder, ecc.)
- Fisici (pirodiserbo, pacciamatura, solarizzazione)
- Biologici (insetti, funghi, bioerbicidi, ecc.)
- Chimici (erbicidi)

Il successo del controllo integrato delle malerbe dipende dalla più efficace combinazione di **Metodi indiretti o preventivi**, **Metodi decisionali** e **Metodi di controllo**

CONTROLLO MALERBE

Metodi diretti di controllo

fisici

meccanici

biologici

chimici

**agricoltura
biologica**

**agricoltura
convenzionale,
integrata e
a basso input**

**....verso il 2030: la gestione delle
malerbe di fronte alle tre sfide della
nuova PAC: cibo, ambiente, territorio**

**la sfida è mettere a punto sistemi di gestione
delle malerbe economici, efficaci e in grado di
salvaguardare la produzione e l'ambiente**

Equazione possibile → Ricerca e Sviluppo

Monitoriamo le malerbe..... ...e non solo loro

iNaturalist 4+
Connettiti con la Natura
iNaturalist, LLC
★★★★★ 4,7, 64 valutazioni
Gratis

Come Funziona

1

Registra le tue osservazioni

2

Condividi con gli altri naturalisti

3

Parla delle tue scoperte

Istantanee iPhone iPad

Anteprima App Store

La Natura a portata di mano

Registra

Registra i tuoi incontri con gli altri organismi e mantieni liste delle forme di vita, tutto nel cloud.

Crea dati utili

Aiuta gli scienziati e i manager delle risorse naturali a capire quando e dove si trovano gli organismi.

Condivi le identificazioni

Connettiti con esperti in grado di identificare le forme di vita che osservi.

Diventa un Cittadino Scienziato

Trova un progetto con uno scopo che ti interessa, o iniziane uno tu.

Conosci La Natura

Incrementa le tue conoscenze parlando con naturalisti e aiutando gli altri.

Inizia un Bioblitz

Organizza un evento in cui le persone cercano di trovare quante più specie possibili.

Funziona su Tutti i tuoi Dispositivi

Installa le nostre applicazioni per cellulari in modo da poter sempre fare osservazioni, anche senza copertura di rete o wifi.

<https://www.inaturalist.org/>

iNaturalist.org è un'iniziativa congiunta della California Academy of Sciences e della National Geographic Society.

Alieni in Umbria

Conoscere per creare consapevolezza

Centro Arpa Umbria
Isola Polvese, 28 settembre 2019

**Grazie per
l'attenzione**

"We never should have waited this long ...
Now the weeds have *completely*
taken over."