

calendario della semina

Specie orticola	Temp.ottimali di semina (in °C)	Periodo	GEN 5-7°C	FEB 6-8°C	MAR 9-11°C	APR 10-12°C	MAG 14-15°C	GIU 18-20°C	LUG 22-24°C	AGO 23-26°C	SET 19-20°C	OTT 15-16°C	NOV 8-10°C	DIC 4-6°C
Basilico	<i>Ocimum basilicum</i> L.													
Cavolo	<i>Brassica oleacea</i> L.													
Ceci	<i>Cicer arietinum</i> L.													
Cicerchia	<i>Lathyrus sativus</i> L.													
Cipolla	<i>Alium cepa</i> L.													
Cocomero	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Mat. & Nakai													
Erba medica	<i>Medicago sativa</i> L.													
Fagiolina Trasimeno	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp													
Fagiolo	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.													
Fagiolo con l'occhio	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp sesquipedalis													
Fave	<i>Vicia faba</i> L. var. <i>maior</i>													
Favino	<i>Vicia minor</i> L.													
Finocchio	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.													
Granturco - Mais	<i>Zea mays</i> L.													
Insalata - Lattuga	<i>Lactuca sativa</i> L.													
Lenticchie	<i>Lens culinaris</i> Medik													
Lupinella	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.													
Melaniana	<i>Solanum melongena</i> L.													
Melone invernale	<i>Cucumis melo</i> L.													
Melone estivo	<i>Cucumis melo</i> L.													
Peperoncino piccante	<i>Capsicum annuum</i> L.													
Peperoni	<i>Capsicum annuum</i> L.													
Pomodoro	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.													
Prezzemolo	<i>Petroselium crispum</i> (Mill.) Fuss													
Rapi Trasimeno	<i>Brassica rapa</i> L.													
Sedano	<i>Apium graveolens</i> L.													
Zucca lunga	<i>Lagenaria</i> spp.													
Zucca dolce	<i>Cucurbita maxima</i> L.													
Zucchine	<i>Cucurbita pepo</i> L.													

In semenzaio - Periodo di semina standard

In semenzaio - Estensione temporale in base alle condizioni climatiche

In campo

 **Banca del Germoplasma**

<https://www.arpa.umbria.it/pagine/banca-del-germoplasma>

